

UPUTA O HOMEOPATSKOM PROIZVODU**CINNABSIN tablete**

Cinnabaris D3, Hydrastis D3, Kalium bichromicum D3, Echinacea D1

Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke:

Ovaj homeopatski proizvod je dostupan bez liječničkog recepta, za liječenje blažih stanja. Ipak, morate ga uzimati oprezno kako biste postigli najbolji učinak.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Obavezno kontaktirajte liječnika, ako se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1. Što je CINNABSIN i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati CINNABSIN
3. Kako uzimati CINNABSIN
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati CINNABSIN
6. Dodatne informacije

1. ŠTO JE CINNABSIN I ZA ŠTO SE KORISTI

CINNABSIN je homeopatski proizvod za liječenje akutnih i kroničnih upala paranazalnih sinusa (sinusitisa). Primjena ovog proizvoda temelji se na načelima homeopatije.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CINNABSIN**Nemojte uzimati CINNABSIN**

- ako ste alergični (preosjetljivi) na krom, *Echinacea-u* ili ostale biljke iz porodice Asteraceae/Compositae (glavočike) ili druge sastojke CINNABSINA.
- ako neko od sljedećih stanja vrijedi za Vas: progresivne sistemske bolesti kao što su tuberkuloza, leukemija ili slične bolesti (leukoze), autoimune bolesti, upalne bolesti vezivnog tkiva (kolagenoze), multipla skleroza, imunodeficijencija (AIDS, infekcija HIV-om), imunosupresija (nakon transplantacije organa ili koštane srži, kemoterapija), kronične virusne bolesti.

CINNABSIN se ne smije primjenjivati kod djece mlađe od 2 godine.


Budite posebno oprezni sa CINNABSINOM

S obzirom da se može raditi o bolesti koja zahtijeva pregled i procjenu liječnika, obratite se svom liječniku

- ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije uslijed primjene ovog homeopatskog proizvoda,
- ako nastaju dodatne tegobe.
- u slučaju pojave otekline lica, vrućice ili jake glavobolje.

Uzimanje drugih lijekova

Interakcije s drugim lijekovima nisu uočene. Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Uzimanje hrane i pića sa CINNABSINOM

Ovaj homeopatski proizvod ne smije se uzimati zajedno s hranom i pićem (vidi dio 3. *Kako uzimati CINNABSIN*).

Negativan utjecaj na djelovanje homeopatskog proizvoda mogu imati općenito negativni čimbenici životnih navika kao i stimulansi ili piće i duhan.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

S obzirom da nema dovoljno raspoloživih podataka o uporabi CINNABSINA, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj homeopatski proizvod tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

CINNABSIN nema učinak na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima CINNABSINA

CINNABSIN sadrži laktozu (mliječni šećer). Ako Vam je liječnik rekao da imate intoleranciju na neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog homeopatskog proizvoda.

CINNABSIN sadrži pšenični škrob koji može sadržavati gluten, ali samo u tragovima, te se zbog toga smatra sigurnim za osobe koje boluju od celijakije.

Pšenični škrob i spojevi koji sadrže živu (npr. Cinnabaris) mogu prouzročiti reakciju preosjetljivosti.

Bolesnici alergični na pšenicu (razlikuje se od celijakije) ne smiju uzimati ovaj homeopatski proizvod.

3. KAKO UZIMATI CINNABSIN

Uvijek uzmite CINNABSIN točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Uobičajena doza je:

Djeca od 2 do 5 godina starosti:

U *akutnim stanjima*, nakon savjetovanja s liječnikom, uzima se 1 tableta svaka 2 sata, do najviše 3 tablete na dan, do poboljšanja stanja.

U *kroničnim stanjima*: uzima se 1 tableta jednom dnevno.

Djeca od 6 do 11 godina starosti:

U *akutnim stanjima* nakon savjetovanja s liječnikom, uzima se 1 tableta svaka dva sata, do najviše 4 tablete na dan, do poboljšanja stanja.

U *kroničnim stanjima*: uzima se 1 tableta 1 - 2 puta dnevno.

Odrasli i djeca u dobi od 12 godina i starija:

U *akutnim stanjima* uzima se 1 tableta svakih sat vremena, do najviše 6 tableta na dan, do poboljšanja stanja.

U *kroničnim stanjima*: uzima se 1 tableta 1 - 3 puta dnevno.

Kada dođe do poboljšanja stanja, potrebno je smanjiti učestalost primjene, do nestanka simptoma.

Ukoliko primijetite da se Vaši simptomi ili simptomi Vašeg djeteta pogoršavaju ili se ne poboljšaju tijekom primjene ovog homeopatskog proizvoda, savjetujte se s Vašim liječnikom.

Ovaj homeopatski proizvod ne smije se uzimati zajedno s hranom i pićem. Tablete se uzimaju pola sata prije ili nakon jela tako da se polako rastope u ustima. Za malu djecu tablete se mogu otopiti u maloj količini vode, na način da se tablete usitne između 2 plastične žlice i otope u maloj količini (3-4 čajne žličice) prokuhane i ohlađene vode, u staklenoj čaši, te se takva otopina daje plastičnom žličicom.

CINNABSIN se ne smije uzimati duže od 8 tjedana bez savjetovanja s liječnikom.

Ako uzmete više CINNABSINA nego što ste trebali

U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih učinaka.

Ukoliko uzmete znatno veću količinu CINNABSINA od preporučene, javite se svom liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti CINNABSIN

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Nastavite uzimati CINNABSIN kao što je gore opisano ili kako Vas je uputio Vaš liječnik, odnosno prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati CINNABSIN

Ako prestanete uzimati CINNABSIN, ne očekuje se pojava štetnih učinaka.

Opća napomena

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog proizvoda, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, CINNABSIN može uzrokovati nuspojave.

U izoliranim slučajevima, nakon uzimanja CINNABSINA mogu se pojaviti reakcije preosjetljivosti kao i mučnina i povraćanje. Nakon uzimanja lijekova koji sadrže Echinacea-u zabilježeni su osip, svrbež, a u izoliranim slučajevima otok lica, otežano disanje, omaglica i pad krvnog tlaka. U ovim slučajevima prestanite uzimati CINNABSIN i javite se svom liječniku.

Ako ste primijetili pojačano lučenje sline, smanjite dozu ili prestanite uzimati CINNABSIN.

Napomena: Postojeće tegobe mogu se privremeno pogoršati kada se uzima homeopatski proizvod (početno homeopatsko pogoršanje). U tim slučajevima prekinite liječenje i konzultirajte svog liječnika.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI CINNABSIN

Ovaj homeopatski proizvod čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

CINNABSIN se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Ovaj homeopatski proizvod ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što CINNABSIN sadrži

1 tableta (250 mg) sadrži:

- 25 mg Cinnabaris D3 triturata, 25 mg Echinacea D1 triturata, 25 mg Hydrastis D3 triturata i 25 mg Kalium bichromicum D3 triturata
- Drugi sastojci su laktoza hidrat, magnezijev stearat, pšenični škrob.

Kako CINNABSIN izgleda i sadržaj pakovanja

Blisteri sa 20 tableta, od PVC i aluminijske folije, u kartonskoj kutiji koja sadrži uputu o homeopatskom proizvodu. 100 tableta po pakiranju.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe, Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Alpen Pharma d.o.o.

Hondlova 2/10

10 000 Zagreb

tel.: 01/2446965

Proizvođač gotovog lijeka

Deutsche Homöopathie - Union

DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostrasse 24

76227 Karlsruhe

Njemačka

Način i mjesto izdavanja homeopatskog proizvoda

Bez recepta, u ljekarni.

Revizija upute

Siječanj 2014.