

UPUTA O HOMEOPATSKOM LIJEKU**COLIKIND oralne kapi**

Chamomilla D6, Cina D6, Colocynthis D6, Lac bovinum defloratum D6, Magnesium chloratum D6

Pažljivo pročitajte cijelu uputu, jer sadrži za Vas važne podatke.

Ovaj homeopatski lijek dostupan je bez liječničkog recepta. Ipak, COLIKIND oralne kapi moraju se pažljivo uzimati kako biste ostvarili najbolje rezultate njihovom primjenom.

- Sačuvajte ovu uputu o homeopatskom lijeku . Možda ćete je morati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, zatražite ih od svojeg ljekarnika.
- Morate se obratiti liječniku ako se simptomi pogoršaju ili se ne poprave.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj ove upute:

1. Što su COLIKIND oralne kapi i za što se koriste
2. Prije nego što počnete koristiti COLIKIND oralne kapi
3. Kako koristiti COLIKIND oralne kapi
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati COLIKIND oralne kapi
6. Dodatne informacije

1. ŠTO SU COLIKIND ORALNE KAPI I ZA ŠTO SE KORISTE

COLIKIND oralne kapi su homeopatski lijek za liječenje nadutosti i kolika u djeci.

Primjena ovog lijeka temelji se samo na načelima homeopatije.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI COLIKIND ORALNE KAPI**Nemojte koristiti COLIKIND oralne kapi**

- ako je Vaše dijete alergično (preosjetljivo) na neku od djelatnih tvari ili bilo koji drugi sastojak COLIKIND oralnih kapi.

Obratite posebnu pažnju pri korištenju COLIKIND oralnih kapi

Savjetujte se s liječnikom ako Vaše dijete slabo reagira na COLIKIND oralne kapi ili ako se pojave dodatne smetnje, jer bi posrijedi mogle biti bolesti koje zahtijevaju liječničku intervenciju.

Uzimanje drugih lijekova s COLIKIND oralnim kapima

Nisu zapažene interakcije s drugim lijekovima. Molimo, obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako Vaše dijete uzima ili je nedavno uzelo bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove dobivene bez liječničkog recepta.

Uzimanje hrane i pića s COLIKIND oralnim kapima

Ne preporučuje se uzimanje COLIKIND oralnih kapi uz obrok. Idealno bi bilo uzeti kapi pola sata prije ili nakon obroka.

Trudnoća i dojenje

Ovaj homeopatski lijek namijenjen je djeci.



Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj homeopatski lijek namijenjen je djeci.

Važne informacije o nekim sastojcima COLIKIND oralnih kapi

COLIKIND oralne kapi sadrže malu količinu alkohola (manje od 100 mg po dozi).

3. KAKO UZIMATI COLIKIND ORALNE KAPI

Uvijek uzimajte COLIKIND oralne kapi točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.
Trebate provjeriti kod svojeg liječnika ili ljekarnika ako niste sigurni.

Uobičajeno doziranje:

Djeca u dobi od 0 do 3 godine:

Kod akutnih tegoba, davati djetetu po 3 kapi svakih sat vremena, do najviše 6 puta dnevno.
Kada se tegobe ublaže, davati 3 puta dnevno po 3 kapi.

Kapi se uzimaju pola sata prije ili nakon obroka tako da se drže u ustima neko vrijeme prije nego što se прогутају. Ako je potrebno, mogu se pomiješati s malo vode.

Ako upotrijebite više COLIKIND oralnih kapi nego što ste trebali

U slučaju predoziranja ne očekuju se štetni učinci.

Ako ste zaboravili primijeniti COLIKIND oralne kapi

Nemojte Vašem djetetu dati dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete koristiti COLIKIND oralne kapi

Ne očekuju se štetni učinci ako prekinete liječenje COLIKIND oralnim kapima.

Opća napomena

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom COLIKIND oralnih kapi obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi COLIKIND oralne kapi mogu izazvati nuspojave, iako se one ne javljaju kod svih osoba.

Nema poznatih nuspojava izazvanih COLIKIND oralnim kapima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu kod Vašeg djeteta nakon uzimanja COLIKIND oralnih kapi, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Napomena: kada se počnu uzimati homeopatski lijekovi, postojeće tegobe mogu se privremeno pogoršati (početno pogoršanje, agravacija). U takvim slučajevima prekinite primjenu homeopatskog lijeka i obratite se svojem liječniku.

5. KAKO ČUVATI COLIKIND ORALNE KAPI

Čuvajte COLIKIND oralne kapi izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvanje ovog lijeka ne zahtijeva nikakve posebne uvjete.

COLIKIND oralne kapi ne smiju se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

COLIKIND oralne kapi treba upotrijebiti unutar 12 mjeseci od otvaranja bočice.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što COLIKIND oralne kapi sadrže

100 g otopine sadržava:

- Homeopatske djelatne tvari u obliku tekućih razrjeđenja: Chamomilla D6 10 g, Cina D6 10 g, Colocynthis D6 10 g, Lac bovinum defloratum D6 10 g, Magnesium chloratum D6 10 g.
- Pomoćne tvari: ksilitol; glicerol (85 postotni, E422); voda, pročišćena.

Kako COLIKIND oralne kapi izgledaju i sadržaj pakovanja

COLIKIND oralne kapi su bistra i bezbojna viskozna otopina.

Oralne kapi pakirane su u smedoj staklenoj bočici od 20 ml.

Proizvođač i nositelj odobrenja za stavljanje homeopatskog lijeka u promet

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottstraße 24

76227 Karlsruhe, Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Alpen Pharma d.o.o.

Hondlova 2/10

10 000 Zagreb

tel.: 01/2446965

Način i mjesto izdavanja homeopatskog lijeka

Bez recepta, u ljekarni.

Datum revizije upute

Listopad, 2015.

